ASPARAGINIAN CARDIO DUO x 50 tabletek



Cena: 12,59 PLN

Opis słownikowy

Producent	UNIPHAR
Rodzaj rejestracji	Suplement diety

Opis produktu

Asparaginian CardioDuo Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych w celu uzupełnienia ich diety w potas, magnez, żelazo i witaminy; zestaw składników odżywczych produktu wzbogacono dodatkowo o asparaginian oraz wyciąg z owoców głogu. Działanie składników zawartych w preparacie na:serceukład krążeniaprawidłowe ciśnienie krwi * tiamina – wspiera prawidłową pracę serca* magnez – pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni (serca)* kwas L- askorbinowy – wpływa na prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych* żelazo – pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek* kwas foliowy – foliany pomagają w prawidłowej produkcji krwi* potas – pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi**Składniki/Substancje aktywne**:Zawartość składników odżywczych w zalecanej dziennej porcji:asparaginian 2,00 mg; magnez 72,00 mg; potas 300,00 mg; wyciąg z owoców głogu 15,40 mg; żelazo 2,10 mg; inulina 21,00 mg; witamina C 53,30 mg; witamina E (mg ekwiwalentu alfa – tokoferolu) 8,00 mg; witamina B1 tiamina 0,73 mg; witamina B2 ryboflawina 0,93; witamina B3 (PP) niacyna 10,66 mg; witamina B5 kwas pantotenowy 4,00 mg; witamina B6 pirydoksyna 0,93 mg; witamina B7 (H) biotyna 33,33 µg; witamina B9 kwas foliowy 133,00 µg; itamina B12 cyjanokobalamina 1,65µg. **Dawkowanie:**2 razy dziennie po 1 tabletce.Nie stosować w niewydolności nerek, podczas antybiotykote-rapii, w czasie biegunki.Nie należy przekraczać porcji zalezanej do spożycia w ciągu dnia.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.**Przeznaczenie:**Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych.**Warunki przechowywania:**Preparat należy chronić przed bezpośrednim światłem, przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25° C w sposób niedostępny dla małych dzieci. **Uwaga!** Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.