

ASPIRIN Cardio 100mg x 56tabl

Cena: 15,26 PLN



Opis słownikowy

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji

Opis produktu

ASPIRIN Cardio 100mg 56 tabletek

Aspirin Cardio to lek podawany w zapobieganiu powstawania zakrzepów. Lek zawiera kwas acetylosalicylowy, który długotrwale stosowany w małych dawkach hamuje zlepianie płytek krwi.

Skład:
Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum).

Jedna tabletkę powlekana zawiera jako substancję czynną 100 mg (Acidum acetylsalicylicum) kwasu acetylosalicylowego (ASA).

Substancje pomocnicze: celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylan metylu, polisorbitat 80, sodu laurylosiarczan, talk, cytrynian trietylu.

Stosowanie:
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza.

Lek należy przyjmować doustnie minimum 30 minut przed posiłkiem, popijając tabletkę w całości dużą ilością wody. Podczas leczenia zawału serca, tabletkę powlekana powinna być rozkruszona lub rozgryziona i połknięta.

Wskazanie:

- niestabilna choroba wieńcowa: 1 tabletkę powlekana raz dziennie
- świeży zawał serca lub jego podejrzenie: 2 do 3 tabletek powlekanych raz dziennie, ważne aby były one rozkruszone co przyspieszy wchłanianie;
- profilaktyka wystąpienia powtórnego zawału serca: 1 tabletkę powlekana raz dziennie;
- zapobieganie powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach (np. przezskórna śródniczywna angioplastyka wieńcowa (PTCA), pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG), endarterektomia tętnicy szyjnej, zespolenie („shunt”) tętniczo-żylny: 1 tabletkę powlekana raz dziennie;

- zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA: 1 tabletkę powlekaną raz dziennie;
- zapobieganie pierwszemu zawałowi serca z wieloma czynnikami ryzyka: 1 tabletkę powlekaną raz dziennie;
- zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki: 1 lub 2 tabletki powlekane raz dziennie.

Nie należy stosować leku Aspirin Cardio: jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników leku; jeśli pacjent przyjmuje metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna; ostra choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy; ciężka niewydolność nerek; ciężka niewydolność wątroby; ciężka niewydolność serca; jeśli w przeszłości występowały napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych; w ostatnim trymestrze ciąży; u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a – rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.