

DIH 500 mg x 60 tbl.



Cena: 39,59 PLN

Opis słownikowy

Producent HASCO

Rodzaj rejestracji

Opis produktu

DIH 500 mg**Składniki:** 1 tabletkę powlekaną zawiera:- zmikronizowaną diosminę 500 mg**Sposób użycia:**Podanie doustne. Zazwyczaj podaje się dwie tabletki na dobę podczas posiłku tj. po 1 tabletkę rano i wieczorem. Jedynie w przypadkach zaostrzenia dolegliwości spowodowanych żylakami odbytu zaleca się podawanie większych dawek do 6 tabletek na dobę, tj. 2 raazy na dobę po 3 tabletki przez 4 dni, a przez kolejne 3 dni zmniejszenie dawki: 4 tabletki na dobę, tj. 2 razy na dobę po 2 tabletki.**Przeznaczenie:**Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych - bóle i nocne kurcze nóg- uczucie ciężkości nóg- żylaki kończyn dolnych- poszerzenia bardzo drobnych naczyń żylnych tzw. pajęczki naczyniowe- obrzęki nóg- objawowe leczenie żylaków odbytu**Przechowywanie:** Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. **Uwaga!**Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.