Apteka Na Kawaleryjskiej OPT SP. Z O.O.
Tel: 577540544 Pozwolenie nr.NFA.8520.1.47.2016, Białystok
ul. Kawaleryjska 52/1
48 577 540 544

DoppelHERZ aktiv Magnez-B6 UltraFAST x 20 szt.

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Producent	QUEISSER PHARMA
Rodzaj rejestracji	Suplement diety

Opis produktu

Doppelherz aktiv Magnez-B6 400 UltraFAST Magnez wpływa na zachowanie równowagi elektrolitów po intensywnym wysiłku fizycznym (w wyniku pocenia) oraz na kurczliwość mięśni (skurcze).Preparat jest zalecany:- w okresach intensywnego treningu,- w stanach wyczerpania,- dla wspomagania pracy mięśni i szybszej regeneracji.Forma mikrogranulek w saszetkach umożliwia szybkie działanie i wygodne stosowanie w dowolnych warunkach, np. na treningu, w klubie fitness czy podczas jazdy rowerem. Mikrogranulki o przyjemnym smaku cytrusowym szybko rozpuszczają się w ustach nawet bez popijaniaJedna saszetka preparatu dostarcza aż 400 mg jonów magnezu. Zapewnienie odpowiedniej ilości magnezu w diecie jest niezbędne dla zachowania równowagi elektrolitów w organizmie, redukcji zmęczenia oraz dla prawidłowej kurczliwości mięśni.**Składniki/Substancje aktywne:**Dzienna Porcja (1 saszetka) Składniki Ilos´c´ (%RWS)magnez 400 mg (107%)wit. B6 6 mg (429%)wit. B9 (kwas foliowy) 400 µg (200%)wit. B12 3 µg (120%) **Dawkowanie:**Stosować 1 saszetkę dziennie, wysypując zawartość bezpośrednio na język; nie wymaga popijania. Nie zaleca się stosowania na czczo.Nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający. Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub glutenu.Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. **Przeznaczenie:**Preparat może być stosowany przez młodzież i osoby dorosłe.**Warunki przechowywania:**Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze do 25oC**Uwaga!** Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.