

## DOPPELHERZ aktiv d/diabetyków x 30 tbl.



Cena: 26,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent	QUEISSER PHARMA
Rodzaj rejestracji	Suplement diety

### Opis produktu

**Doppelherz aktiv Dla diabetyków** kompletny zestaw 14 witamin i składników mineralnych – opracowany specjalnie dla chorych na cukrzycę i osób odchudzających się w celu uzupełnienia diety. Chrom wpływa na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Chrom wpływa na aktywność insuliny i poprzez to na utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Cynk pełni ważną rolę w metabolizmie węglowodanów, a witamina B6 w metabolizmie glikogenu (m.in. w wychwytywaniu glukozy przez komórki). Witaminy B6, B12 i kwas foliowy korzystnie wpływają na poziom homocysteiny we krwi, co ma istotne znaczenie w przypadku cukrzycy. U osób chorych na cukrzycę obserwuje się wzmożone tworzenie wolnych rodników (tzw. stres oksydacyjny). Cynk, selen, witaminy C i E chronią komórki przed zwiększonym stresem oksydacyjnym, typowym dla cukrzycy. Witaminy B1, B2, B3 (niacyna), B5 (kwas pantotenowy), B6, B12, biotyna i wit. C oraz magnez biorą udział w prawidłowym wykorzystywaniu energii przez organizm. **Składniki/Substancje aktywne:** Dzienna Porcja (= 1 Kapsułka) Składniki Ilość (%RWS) wit. B1 (tiamina) 2 mg (182%) wit. B2 (ryboflawina) 1,6 mg (114%) wit. B3 (niacyna) 18 mg (113%) wit. B5 (kwas pantotenowy) 6 mg (100%) wit. B6 3 mg (214%) wit. B7 (biotyna) 150 µg (300%) wit. B9 (kwas foliowy) 450 µg (225%) wit. B12 9 µg (60%) witamina C 200 mg (250%) witamina E 42 mg (350%) magnez 200 mg (53%) cynk 5 mg (50%) chrom 60 µg (150%) selen 30 µg (55%) **Dawkowanie** 1 tabletkę dziennie z posiłkiem, popijając obficie płynem. Tabletkę można dzielić - dla ułatwienia połykania. Po 2 miesiącach stosowania można stosować 1 tabletkę dziennie. W celu osiągnięcia właściwego efektu zalecane jest przyjmowanie preparatu przez co najmniej kilka miesięcy. Nie łączyć z innymi preparatami mineralno-witaminowymi. Należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących przyjmowania leków! Dla prawidłowego metabolizmu zaleca się zdrowy tryb życia i zrównoważoną dietę. Preparat może być stosowany przez osoby z nietolerancją laktozy lub glutenu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. **Przechowywanie:** Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze do 25°C. **Uwaga!** Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.