Apteka Na Kawaleryjskiej OPT SP. Z O.O.
Tel: 577540544 Pozwolenie nr.NFA.8520.1.47.2016, Białystok
ul. Kawaleryjska 52/1
48 577 540 544

DOPPELHERZ aktiv Meno Forte x 30 tbl.

Cena: 27,89 PLN

Opis słownikowy

Producent	QUEISSER PHARMA
Rodzaj rejestracji	Suplement diety

Opis produktu

Doppelherz aktiv Aktiv-Meno FORTE Preparat jest zalecany dla kobiet po 40 roku życia, dla lepszego samopoczucia w okresie menopauzy i zdrowia po menopauzie. Składniki preparatu:- łagodzą uderzenia gorąca Standaryzowany wyciąg z szyszek chmielu pomaga łagodzić objawy związanez okresem menopauzy, takie jak: uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, trudności z zasypianiem, drażliwość, gwałtowne bicie serca.- ułatwiają zasypianie Standaryzowany wyciąg z szyszek chmielu pomaga łagodzić objawy związanez okresem menopauzy, takie jak: uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, trudności z zasypianiem, drażliwość, gwałtowne bicie serca.- wspomagają koncentracjęWitaminy z grupy B (B1, B3, B5, B7, B9, B12) oraz jod wspomagają procesy koncentracji i zapamiętywania. Witaminy z grupy B (poza wit. B1 i B7,) redukują również skutki zmęczenia.- wzmacniają kościWapń i witamina D sprzyjają prawidłowej mineralizacji tkanki kostnej oraz wzmocnieniu kości.Jest to szczególnie istotne dla kobiet po menopauzie.**Składniki/Substancje aktywne**Dzienna Porcja (=1 Tabletka)Składniki Ilos´c´ (%RWS)Koncentrat sojowy 125 mg- izoflawony 50 mgszyszki chmielu (wyciąg) 50 mgwapń 400 mg (50%)jod 100 µg (67%)witamina D 10 µg (200%)wit. B1 (tiamina) 0,55 mg (50%)wit. B2 (ryboflawina) 0,7 mg (50%)wit. B3 (niacyna) 16 mg (100%)wit. B5 (kwas pantotenowy)6 mg (100%)wit. B6 0,7 mg (50%)wit. B7 (biotyna) 50 µg (100%)wit. B9 (kwas foliowy) 200 µg (100%)wit. B12 2,5 µg (100%)**Dawkowanie:**1 tabletka dziennie po posiłku. Tabletkę można dzielić. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się co najmniej dwumiesięczne stosowanie.Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.W przypadku stwierdzonych niedoborów jodu w organizmie skonsultować się z lekarzem. Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub glutenu.**Warunki przechowywania:**Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temp. do 25oC.**Uwaga!** Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.