

DOPPELSIL MAX 50mg x 4tbl

Cena: 20,32 PLN



Opis słownikowy

Producent DOPPELHERZ PHARMA GMBH

Rodzaj rejestracji

Opis produktu

DoppelSil Max 50 mg jest lekiem, który zawiera substancję czynną - syldenafil. Należy do grupy leków hamujących enzym fosfodiesterazę typu 5 (tzw. inhibitory PDE5).

Lek DoppelSil Max działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. DoppelSil Max pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Skład:

Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletki zawiera 50 mg syldenafilu (w postaci syldenafilu cytrynianu).

Pozostałe składniki to: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E 951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do ustalenia pH) lub kwas solny, stężony (do ustalenia pH).

Dawkowanie:

- Jeśli pacjent stosował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecana dawka leku to 50 mg. W przeciwnym razie lek DoppelSil Max w dawce 50 mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg nie odczuł pożądanego efektu (czyli nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku).
- Jeśli zastosowanie leku zawierającego syldenafil w niższej dawce (25 mg) pozwoliło na uzyskanie erekcji umożliwiającej odbycie stosunku seksualnego nie należy stosować dawki 50 mg.
- Nie przyjmować leku DoppelSil Max częściej niż raz na dobę.
- Nie należy przyjmować tego leku jednocześnie z innymi lekami zawierającymi syldenafil.
- Lek DoppelSil Max należy przyjmować na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy żuć w całości a następnie połknąć.
- W przypadku wrażenia, że działanie leku DoppelSil Max jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek DoppelSil Max umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku DoppelSil Max jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.

- Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku DoppelSil Max nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.
- Lek DoppelSil Max należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.