

ENTitis Baby smak truskawkowy x 30sas

Cena: 53,00 PLN



Opis słownikowy

Producent	POLSKI LEK
Rodzaj rejestracji	Suplement diety

Opis produktu

ENTitis® Baby o smaku truskawkowym jest suplementem diety, który został opracowany z myślą o uzupełnieniu diety niemowląt powyżej 6 miesiąca życia oraz dzieci. Wygodna do stosowania forma saszetki z proszkiem ułatwia podanie preparatu najmłodszym dzieciom.

Formuła preparatu doustnego ENTitis® Baby zawiera w składzie szczep *Streptococcus salivarius* K12 w formie Bactoblis®, efekt 30 lat badań naukowców. W warunkach fizjologicznych szczep ten kolonizuje jamę ustną i jamę gardłowo-nosową.

Proszek o truskawkowym smaku ENTitis® Baby został dodatkowo uzupełniony wysoką porcją witaminy D oraz fruktooligosacharydy (FOS). Witamina D wspiera utrzymanie prawidłowej odporności organizmu. Dodatkowo składnik ten przyczynia się do prawidłowego wzrostu i rozwoju kości u dzieci.

Zastosowanie:

Uzupełnienie diety w bakterie z rodzaju *Streptococcus* i witaminę D, w szczególności dla niemowląt powyżej 6 miesiąca życia i dzieci:

w okresie jesienno-zimowym,
przebywających w dużych skupiskach, w tym uczęszczających do żłobka lub przedszkola,
mających zwiększoną skłonność do odczuwania dyskomfortu ze strony ucha, nosa, gardła,
po zakończonej kuracji antybiotykowej.

Zalecane spożycie:

Niemowlęta powyżej 6 miesiąca życia i dzieci: 1 saszetka dziennie przez minimum 3 miesiące.

Zawartość saszetki należy podawać przed snem po umyciu zębów, tak, aby przez noc szczep mógł skutecznie skolonizować jamę ustną i gardziel.

Czas podawania preparatu dziecku powinien wynosić około 5 minut, aby maksymalnie wydłużyć jego kontakt ze śluzówką jamy ustnej dziecka.

Bezpośrednio po podaniu preparatu nie należy jeść i pić.

Podawanie preparatu za pomocą smoczka:

- otworzyć saszetkę i wsypać jej zawartość do czystego kieliszka,
- wilgotny smoczek zanurzyć w proszku,
- smoczek z proszkiem umieścić w buzi dziecka i poczekać ok. 30 sekund, aż proszek się rozpuści,
- powtarzać czynność do momentu, aż poda się dziecku całą porcję saszetki.

Podawanie preparatu bez użycia smoczka:

- zawartość saszetki rozpuścić w niewielkiej ilości wody,
- podawać łyżeczką małymi porcjami przez około 5 minut.