

FERVEX MALINOWY 12 saszetek



Cena: 22,95 PLN

Opis słownikowy

Producent UPSA SAS

Rodzaj rejestracji

Opis produktu

Fervex o smaku malinowym

Produkt leczniczy do leczenia doraźnego objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych jak np. ból głowy, gorączka, katar. Lek działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego w postaci roztworu.

Leku nie stosować dłużej niż 5 dni bez konsultacji z lekarzem.

W leczeniu stanów grypopodobnych lepiej jest przyjmować lek rozpuszczony w gorącej wodzie, wieczorem, jak najszybciej od wystąpienia objawów.

Stosowanie leku w przypadku zaburzonej czynności nerek należy zachować co najmniej 8-godzinną przerwę pomiędzy dawkami.

Młodzież powyżej 15 lat i dorośli: 1 saszetka 2-3 razy na dobę. Saszetki można stosować co 4 godziny (nie wcześniej).

Sposób przygotowania: zawartość jednej saszetki rozpuścić w szklance gorącej / zimnej wody.

Działanie

Fervex o smaku malinowym to lek złożony, który wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwhistaminowe (co wiąże się ze zmniejszeniem przekrwienia błony śluzowej nosa, hamowaniem odruchu kichania i łzawienia oczu). Dodatkowo lek uzupełnia niedobory witaminy C (kwasu askorbowego).

Wskazania

Leczenie objawów grypy, stanów grypopodobnych, przeziębienia u osób powyżej 15 lat i dorosłych jak:

ból głowy,
gorączka,

zapalenie błony śluzowej nosa i gardła.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Fervex:

w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli u pacjenta występuje: ciężka niewydolność nerek lub wątroby (obecność paracetamolu), jaskra z wąskim kątem przesączania,
rozrost gruczołu krokowego z utrudnionym oddawaniem moczu,
u osób poniżej 15 lat.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Skład

Substancjami czynnymi są: paracetamol (Paracetamolum), kwas askorbowy (Acidum ascorbicum), feniramina (Pheniraminum maleas).

1 saszetka zawiera: 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego i 25 mg maleinianu feniraminy.

Substancje pomocnicze: sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, guma arabska, sacharyna sodowa; aromat malinowy: octan etylu, octan izoamylu, kwas octowy, alkohol benzylowy, trójacetyna, wanilina, p-hydroksybenzylacetone, maltodekstryna, modyfikowana skrobia kukurydziana E 1450, barwnik Allura Red E 129, błękit brylantowy E 133, żółcień pomarańczowa, Permastabil 505528 RI, malina 054428 A, sodu chlorek, sodu siarczan.