

HITAXA Fast Junior 2,5 mg 10 tabletek



Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

Hitaxa Fast junior. Lek przeciwalergiczny. Hitaxa Fast Junior jest wskazany w celu łagodzenia objawów związanych z: alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (takich jak: kichanie, swędzenie lub wydzielina z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu) lub pokrzywką. Hitaxa Fast Junior jest lekiem przeciwalergicznym, niewywołującym senności.
Składniki/Substancje aktywne: Każda tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2,5 mg desloratadyny.
Dawkowanie: Dzieci w wieku 6 do 11 lat: jedną 2,5 mg tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej produktu Hitaxa Fast Junior umieścić w jamie ustnej raz na dobę. Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): dwie 2,5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej produktu Hitaxa Fast Junior umieścić w jamie ustnej raz na dobę. Leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i pokrzywki desloratadyną bez konsultacji lekarskiej nie powinno trwać dłużej niż 10 dni. Sposób podawania: dawkę można przyjmować niezależnie od posiłku. Bezpośrednio przed użyciem blister należy ostrożnie otworzyć i wyjąć bez kruszenia tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej. Tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej umieszcza się w jamie ustnej, gdzie ulega on natychmiastowemu rozpadowi. Woda lub inny płyn nie są potrzebne, aby połączyć dawkę. Dawkę należy przyjąć natychmiast po otwarciu blistra.
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Uwaga! Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.