

NARANYL Spray 50 ml



Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Producent	NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

NARANYL Spray 50 ml

Wyrób medyczny pod postacią spray'u o właściwościach antybakteryjnych i antyseptycznych. Działa wspomagająco w leczeniu uszkodzeń skóry. Produkt ma szerokie zastosowanie – hamuje niewielkie krwawienia, działa dezynfekująco, zmniejsza odczuwanie bólu, nawilża i pielęgnuje podrażnioną skórę,

Preparat przyspiesza gojenie ran dzięki ochronnemu filmowi, który tworzy na ich powierzchni. Ochronia je również przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Skład:
Woda, gliceryna, karboksymetylochitozan, hialuronian sodu, srebro.

Główny składnik preparatu – chitozan (organiczny związek chemiczny z grupy polisacharydów) – charakteryzuje się szerokim spectrum działania. Jego właściwości polegają na wytworzeniu na skórze warstwy ochronnej. Bariera ta zapobiega przenikaniu drobnoustrojów do wnętrza rany, chroniąc tym samym przed zakażeniem.

Ponadto, wyrób stymuluje procesy regeneracji skóry. Poprzez absorpcję wysięku, skutecznie hamuje krwawienie. Kwas hialuronowy zawarty w produkcie wspiera i przyspiesza regenerację naskórka.

Stosowanie:

1. Przed użyciem wstrząsnąć kilka razy buteleczką z wyrobem.
2. Pierwsze użycie wymaga kilkukrotnego naciśnięcia dozownika celem wypełnienia go płynem.
3. Aplikator skierować na uszkodzony obszar i spryskać go.
4. Preparat aplikować w odległości ok. 10 cm od rany.
5. Alternatywnie można przecierać ranę nasączonym wyrobem wacikiem.

Stosować 2-3 razy dziennie po 2-4 dawki w zależności od potrzeb.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Stosować maksymalnie przez 7 dni.

Produkt przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej (15-25°C). Chronić od światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Kobiety w ciąży i karmiące przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Produkt nie nadaje się do stosowania przez dzieci poniżej 3. roku życia. U dzieci starszych wyrób stosować pod nadzorem osoby dorosłej.