

NEOBIOTIC aerozol 16g



Cena: 19,79 PLN

Opis słownikowy

Producent TARCHOMIŃSKIE ZAKŁ. FARM. POLFA S.A.

Rodzaj rejestracji

Opis produktu

Czym jest Neobiotic?

Neobiotic jest lekiem w aerozolu przeznaczonym do krótkotrwałego miejscowego stosowania w przypadku zakażeń bakteryjnych skóry, drobnych ran (zadrapania, otarcia, ukąszenia owadów) niewielkich owrzodzeń i oparzeń. Produkt leczniczy zawiera neomycynę jako substancję czynną, podawany jest na skórę.

Substancja czynna leku Neobiotic - neomycyna - jest antybiotykiem aminoglikozydowym o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Działa na wiele bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.

Lek może być stosowany u osób w wieku 12 lat i starszych.

Jakie są wskazania do zastosowania leku Neobiotic?

Krótkotrwałe, miejscowe stosowanie w przypadku:
zakażeń bakteryjnych skóry,
drobnych ran (zadrapania, otarcia, ukąszenia owadów),
niewielkich owrzodzeń i oparzeń.

Substancja czynna: Neomycynium

Skład

1 g zawiesiny zawiera 11,72mg neomycyny (Neomycynium) w postaci siarczanu neomycyny.

Substancje pomocnicze: Sorbitanu trioleinian, Lecytyna (pochodzenia zwierzęcego), Izopropylu mirystynian, Drivosol 35A [propan (min. 23 %), n-butan (max. 5,0 %), izobutan (min. 71,5 %)]

Neobiotic - stosowania i dawkowanie leku

Neobiotic przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania (3 do 7 dni). Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Stosowanie:

Neobiotic stosuje się miejscowo na skórę. Przed każdym użyciem kilkakrotnie energicznie wstrząsnąć pojemnik.

Chorobowo zmienione miejsca na skórze spryskiwać strumieniem zawiesiny przez 1 do 3 sekund, trzymając pojemnik pionowo, główką rozpyłową do góry, w odległości 15 cm do 20 cm.

Zwykle produkt leczniczy stosuje się 2 lub 3 razy na dobę, w równych odstępach czasu.

Skrajnie łatwopalny aerozol. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

Uwaga: Chronić oczy przed rozpylaną substancją. Nie wdychać rozpylanej substancji.

Pacjent nie powinien stosować produktu leczniczego bez porozumienia z lekarzem, dłużej niż 7 dni.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy nie należy stosować leku Neobiotic?

Nadwrażliwość na neomycynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie stosować na uszkodzone i duże powierzchnie skóry, sączące zmiany chorobowe i owrzodzenia żylakowate.

Nie stosować na błony śluzowe. Nie stosować łącznie z innymi lekami ototoksycznymi i (lub) nefrotoksycznymi.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Zawartość:

16 g