

OFTAHIST krop.dooczu,roztw. 1 mg/ml 1but.



Cena: 30,59 PLN

Opis słownikowy

Producent ADAMED PHARMA S.A.

Rodzaj rejestracji

Opis produktu

Wskazania i działanie

Oftahist jest przeznaczony do leczenia podmiotowych i przedmiotowych objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

Skład

Substancją czynną leku jest olopatadyna 1 mg/ml (w postaci chlorowodorku)

Pozostałe składniki leku to benzalkoniowy chlorek, sodu chlorek, disodu wodorofosforan bezwodny, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH), woda oczyszczona

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to jedna kropla do oka lub oczu, dwa razy na dobę – rano i wieczorem.

Nie stosować przy założonych miękkich soczewkach kontaktowych. Po zakropleniu leku należy odczekać 10-15 minut i dopiero potem założyć soczewki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Oftahist:

jeśli pacjent ma uczulenie na olopatadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (Mogą dotyczyć do 10 na 100 pacjentów):

Działania dotyczące oka:

ból lub obrzęk oka, podrażnienie oka, suchość oka, nietypowe odczucia wewnątrz oka.

Działania dotyczące całego organizmu:

bóle głowy, zmęczenie, suchość nosa, nieprzyjemny smak w ustach.

