

Olimp Chela-Mag B6 Junior x 15 sasz.

Cena: 25,58 PLN



Opis słownikowy

Producent	OLIMP
Rodzaj rejestracji	Suplement diety

Opis produktu

Chela-Mag B6® Junior to suplement diety w proszku, przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia ułatwiający pokrycie zapotrzebowania organizmu na magnez i witaminę B6 o pysznym pomarańczowym smaku. Chela-Mag B6® Junior jest jedynym na rynku preparatem magnezowym dla dzieci, zawierającym wysoko przyswajalną i hipoalergiczną formę magnezu w postaci chelatu aminokwasowego Albion® (diglicynian magnezu), wzbogaconą witaminą B6, która współpracuje z magnezem w procesach metabolicznych. Główne zalety Chela-Mag B6® Junior to: - wysoko przyswajalna i hipoalergiczna forma magnezu wzbogacona witaminą B6- aż 150mg jonów magnezu w postaci bezpiecznego i wysoko przyswajalnego - chelatu aminokwasowego Albion® w jednej saszetce- wysmienity pomarańczowy smak- perfekcyjna rozpuszczalność- brak konserwantów- tylko jedna saszetka dziennie

Składniki/Substancje aktywne:Zawartość w 1 saszetce % RWS*Magnez 150 mg 40%*Witamina B6 1 mg 71,4%***Dawkowanie:**1 saszetka na dobę, najlepiej po śniadaniu lub po posiłku głównym. Zawartość saszetki rozpuścić w 100-120 ml wody o temperaturze pokojowej, zamieszać w celu całkowitego rozpuszczenia proszku. Spożyć zaraz po przygotowaniu. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. **Przeznaczenie** Przeznaczenie: preparat przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia, jako suplement diety ułatwiający pokrycie zapotrzebowania organizmu na magnez oraz witaminę B6, szczególnie w okresie wzmożonego zapotrzebowania na ten składnik, będącego wynikiem osłabienia organizmu lub zwiększonego wysiłku umysłowego. **Warunki przechowywania:**Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. **Uwaga!** Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.