

OPATR.HYDROKOL. GRANUFLEX 20x20cm 1 szt.

Cena: 24,55 PLN



Opis słownikowy

Producent	CONVATEC
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opatrunki **Granuflex** są to jałowe opatrunki hydrokolooidowe, złożone z wewnętrznej (stykającej się z raną) warstwy hydrokolooidowej na podłożu samoprzylepnego polimeru, oraz z warstwy zewnętrznej - pianki poliuretanowej. Opatrunek pod działaniem wydzielin z rany tworzy wilgotne środowisko sprzyjające procesom gojenia, wchłania płyny wysiękowe oraz wspomaga autolizę tkanek martwiczych. Opatrunki Granuflex mogą być stosowane bezpośrednio na ranę lub w kombinacji z innymi opatrunkami. ZASTOSOWANIE: Rany przewlekłe - odleżyny (I-IV stopnia), owrzodzenia podudzi. Rany ostre - rany chirurgiczne (pooperacyjne, miejsca pobrania przeszczepów skóry), rany urazowe (np. niewielkie otarcia, rany szarpane), oparzenia (I i II stopnia), miejsca po wycięciach zmian skórnych.

Wskazania

Przewlekłe owrzodzenia,
Epidermolysis bullosa

Sposób użycia

Należy stosować opatrunek o rozmiarze umożliwiającym pokrycie rany z 2-centymetrowym marginesem zdrowej skóry.

Uwaga: Ponieważ opatrunek wchłania płyny wysiękowe, tworzący się żel może być widoczny pod postacią pęcherzyka pod zewnętrzną powierzchnią opatrunku.

Usunąć ze spodniej powierzchni opatrunku silikonowny papier zabezpieczający. Unikać dotykania palcami samoprzylepnej powierzchni.

Nałożyć na ranę opatrunek ruchem rozwijającym. Nie naciągać opatrunku.

Dla zapewnienia właściwego przylegania wygładzić i docisnąć opatrunek wzdłuż brzegów rany.

W razie potrzeby zabezpieczyć brzegi opatrunku hypoalergicznym plastrem.

Aby usunąć opatrunek należy jedną ręką ucisnąć; skórę a drugą unieść brzeg opatrunku.

Nie zaleca się pozostawiania tego samego opatrunku przez okres dłuższy niż 7 dni.

Przeciwwskazania

Opatrunki nie powinny być stosowane u osób, o których wiadomo, że są uczulone na opatrunki Granuflex lub ich składniki.

Ostrzeżenia

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed zastosowaniem wyrobu, należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zawartość:

1 sztuka

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C