

PARACETAMOL zaw.doust. 0,12g/5ml Aflofarm



Cena: 5,58 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji

Opis produktu

Co to jest Paracetamol Aflofarm?

Paracetamol Aflofarm jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym w postaci zawiesiny o truskawkowym smaku.

Lek zawiera substancję czynną paracetamol. Wskazania do stosowania gorączka i bóle różnego pochodzenia o małym i umiarkowanym nasileniu.

Wskazania

Paracetamol wskazany jest w gorączce np. w przebiegu przeziębienia i grypy. Leczeniu bólów o małym i umiarkowanym nasileniu:

- bóle głowy,
- bóle zębów,
- bóle związane z ząbkowaniem,
- bóle mięśniowe,
- bóle kostno-stawowe,
- bóle po zabiegach stomatologicznych i chirurgicznych.

Substancja czynna: Paracetamolum

Skład

Substancja czynna: Substancją czynną leku jest paracetamol. 5 ml zawiesiny doustnej zawiera substancję czynną 120 mg paracetamolu.

Pozostałe składniki: polisorbat 80, sacharoza, guma ksantan, sacharyna sodowa, sodu benzoesan, kwas cytrynowy bezwodny, czerwień koszenilowa (E 124), substancja poprawiająca smak i zapach truskawkowa (AR 0012/F), woda oczyszczona.

Paracetamol Aflofarm dawkowanie

Zalecana dawka

Dawkę ustala się wg masy ciała dziecka (przeciętnie jednorazowo 10-15 mg/kg mc.) lub wg poniższego schematu. Dzieci w wieku od 3 m. ż. do 12 m. ż.: 2,5 do 5 ml (60 do 120 mg paracetamolu) w wieku od 1 do 6 lat: 5 do 10 ml (120 do 240 mg paracetamolu) w wieku od 6

do 12 lat: 10 do 20 ml (240 do 480 mg paracetamolu)

Wstrząsać przed użyciem.

Nie należy podawać leku częściej niż co 4 godziny, maksymalnie do 4 dawek na dobę (60 mg paracetamolu /kg mc./24 godziny).

Dzieci

U dzieci poniżej 2 lat lek należy stosować w porozumieniu z lekarzem.

Nie podawać dzieciom dłużej niż 3 dni bez porozumienia z lekarzem.

Przeciwwskazania

- jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
 - jeśli pacjent ma wirusowe zapalenie wątroby;
 - jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby i (lub) nerek;
- w przypadku choroby alkoholowej.

Zawartość:

1 butelka po 100 ml

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Ostrzeżenia

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia działań toksycznych paracetamolu, nie należy stosować leku Paracetamol Aflofarm jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Paracetamol Aflofarm należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby;

jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, ponieważ istnieje ryzyko uczulenia na paracetamol;

jeśli pacjent ma niedobór enzymu dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej lub dehydrogenazy reduktazy.

Przed wykonaniem badań laboratoryjnych pacjent powinien powiedzieć lekarzowi, że przyjmuje lek Paracetamol Aflofarm, gdyż może on fałszować wyniki niektórych badań (np. oznaczenie stężenia glukozy lub kwasu moczowego we krwi).

Bez porozumienia z lekarzem nie należy stosować leku dłużej niż:

10 dni w przypadku dolegliwości bólowych;

3 dni w przypadku utrzymującej się gorączki;

2 dni w przypadku objawów przeziębienia.

W trakcie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu.