

PIROLAM zawiesina 1% 20 g



Cena: 24,29 PLN

Opis słownikowy

Producent MEDANA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

Pirolam zawiesina 1% 20g

Preparat o działaniu przeciwgrzybiczym

Składniki/Substancje aktywne:

cyklopiroksolamina (ciclopiroxum)

Dawkowanie:

Lek stosuje się miejscowo na skórę. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle lek Pirolam stosować 2 razy na dobę na zmienioną chorobowo skórę, lekko wcierając lub pozostawiając do wyschnięcia. Leczenie należy prowadzić aż do ustąpienia objawów chorobowych. Optymalny czas leczenia wynosi 3 tygodnie. Aby zapobiec nawrotowi choroby zaleca się kontynuowanie leczenia przez okres do 10 dni po ustąpieniu zmian chorobowych. Jeśli objawy nie ustąpią po 4 tygodniach, należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Przeznaczenie:

Lek przeciwgrzybiczy przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Leczenie grzybic skóry gładkiej, owłosionej, grzybic stóp, paznokci, podudzia. Działa na występujące na skórze dermatofity, grzyby drożdżopodobne, pleśnie, mieszane zakażenia grzybicze. Ma on również działanie przeciwzapalne, co jest istotne szczególnie wtedy, gdy grzybicy towarzyszy stan zapalny. Do skóry lek przenika poprzez naskórek, mieszki włosowe i gruczoły łojowe.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga! Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.