

## SYMETYKON MAX APTEO x 30 kaps.

Cena: 22,49 PLN



### Opis słownikowy

Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

#### SYMETYKON MAX APTEO 30 kapsułek

Wyrób medyczny Symetykon MAX przeznaczony jest do stosowania w celu łagodzenia uczucia pełności, uczucia wzdęcia, odbijania, dolegliwości związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów oraz powietrza w przewodzie pokarmowym, które powodują napięcie i ucisk w jelitach. Symetykon MAX przeznaczony jest również do stosowania pomocniczo w celu przygotowania pacjentów do badań diagnostycznych jary brzusznej (ultrasonografii, endoskopii, radiografii i kolonoskopii), w celu usunięcia z przewodu pokarmowego gazów i powietrza, co poprawia jakość pozyskiwanych obrazów.

Symetykon MAX zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazów w jelitach, przez co ułatwia ich pękanie, a następnie wydalanie. Symetykon wykazuje działanie powierzchniowe i nie wchodzi w jakiegokolwiek reakcje chemiczne. Jest substancją farmakologicznie i fizjologicznie obojętną.

#### Skład:

Wyrób medyczny Symetykon MAX zawiera 240 mg symetykonu w 1 kapsułce miękkiej żelatynowej. Składnikami otoczki są: żelatyna wieprzowa, glicerol. Wyrób medyczny nie zawiera cukru ani barwników.

#### Stosowanie:

Kapsułki stosuje się doustnie, przed lub po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu (np. 1 szklanka wody). W trakcie stosowania preparatu nie zaleca się picia napojów gazowanych.

#### Objawy związane z napięciem i uciskiem w jelitach:

- Dorośli: doraźnie 1 kapsułka, 2-4 razy dziennie.
- Maksymalnie 4 kapsułki dziennie (960 mg symetykonu).
- Kobiety w ciąży: dawkowanie i sposób użycia według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- U osób chorych na cukrzycę nie jest wymagana zmiana dawkowania.
- Dzieci od 12. do 18. roku życia: doraźnie 1 kapsułka dziennie.

Przygotowanie do badań diagnostycznych:

- Dorośli: 1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym badanie diagnostyczne i 1 kapsułka rano, na czczo, w dniu badania diagnostycznego.
- Kobiety w ciąży: dawkowanie i sposób użycia według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- U osób chorych na cukrzycę nie jest wymagana zmiana dawkowania.
- Dzieci od 12. do 18. roku życia: 1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym badanie diagnostyczne i 1 kapsułka rano, na CZCZO, w dniu badania diagnostycznego.
- Wyrób może być stosowany u osób chorych na cukrzycę oraz u osób z zaburzeniami trawienia cukrów.

Nie wolno stosować więcej niż 4 kapsułki dziennie u dorosłych i kapsułkę dziennie u dzieci powyżej 12. roku życia.

Symetykon może zmniejszać biodostępność jednocześnie zażywanych leków. W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania wyrobu z innymi lekami należy zachować co najmniej podzinną przerwę pomiędzy zażyciem wyrobu medycznego Symetykon MAX i innych preparatów. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku jednoczesnego stosowania lewotyroksyny oraz symetykonu należy zachować 4-godzinny odstęp.

Jeżeli objawy nasilają się lub utrzymują się przez dłuższy czas, należy zasięgnąć porady lekarza.